

Komplikacije bolezni	Pogostnost komplikacij	Neželeni učinek		Pogostnost neželenih učinkov
Davica		Petvalentno cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in okužbi s Hemofilusom influence tipa b		
zapora dihalnih poti sekundarna bakterijska pljučnica prizadetost srca (miokarditis, ki lahko vodi v srčno odpoved s kardiogenim šokom) prizadetost živčevja (nevritis)	ni podatka ni podatka srčna mišica prizadeta pri 2/3 obolelih odvisna od resnosti in obsežnosti okužbe – pri hudih okužbah 3/4 obolelih 5-10% (do 20% pri otrocih mlajših od 5 let in odraslih starejših od 40 let)	Blagi	na mestu vnosa cepiva: • blaga bolečina • oteklina • rdečina nemirnost zaspanost vročina slabši apetit bruhanje driske krvavitve ali modrice na mestu vnosa cepiva oteklina bezgavk kašelj izcedek iz nosu izpuščaj	10%

dehidracija ali izguba telesne teže epileptični napadi poškodbe možganov smrt	1,1% 0,3% 1%			
Otroška paraliza				
stalna paraliza mišic, invalidnost deformacije kosti miokarditis odpoved dihanja zapleti na prebavilih post-polio sindrom smrt	0,5% ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 25-40% prej obolelih 2-10% pri paralitičnem poliomyelitisu; 20-60% pri spinobulbarni obliki			
Okužba s Hemofilus influenza tipa b				
dolgotrajna vročina trajni nevrološki znaki vnetje poklopca vnetje sklepov vnetje kože pljučnica vnetje kosti smrt zaradi meningitisa	10-15% 15-30% 17% 8% 6% 15% 2% 3-6% (tudi do 40% v državah v razvoju)			
Hepatitis B				
kronična okužba jetrna ciroza rak jeter fulminantna okužba*	90% okuženih ob rojstvu, 30-50% okuženih med 1. in 5. letom, 5% starejših 20% obolelih s kronično okužbo 5% ljudi s cirozo zaradi okužbe 1%			

*zelo hitro potekajoča oblika okužbe, ki pogosto vodi v jetrno odpoved in je smrtna brez ustreznega zdravljenja